

Det patologisk

(Meddelte ved p. 100)

Året 1904 er der ve

For Medicin

- Kirurg

- Stube

- Nerve

- Hudsy

- Øien-a

- Barne

Sam for F

For Kinsti

For privat

er det - v

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

54 gange.

olieret, var i

der tilsat, var

er det - v

14

Beretning

for

Det patologisk-anatomiske institut i 1904.

(Meddelt ved prosector ved Rigshospitalet prof. *Harbitz*).*

aaet 1904 er der ved institutet foretaget 218 obduktioner:

For Medicinsk afdeling A	50	obduktioner
- — — B	59	—
- Kirurgisk — A	28	—
- — — B	20	—
- Strube- og øre-afdelingen	8	—
- Nerve-afdelingen	4	—
- Hudsyge-afdelingen	9	—
- Øien-afdelingen	—	—
- Barne-afdelingen	7	—
Sum for Rigshospitalet	185	operationer.
For Kristiania fødselsstiftelse	4	—
For private læger er der dels paa dels uden-		
for institutet af dettes assistenter udført	29	—

218 operationer.

Besuden er der — væsentlig for Kristiania fødselsstiftelse — obduceret 67 børn: 16 levende fødte, 45 dødsfødte, 6 aborter. Endvidere er der øgt tilsendte organer fra obduktioner af privatlæger og sygehuse udenfor et ialt 54 gange.

af de obducerede var 127 mænd, 91 kvinder. De 54 obduktioner, hvor- organer blev tilsendt, var fra 35 mænd, 15 kvinder; i 4 tilfælde var kønnet givet.

Beretningen er i alt væsentligt udarbejdet af 1ste assistent cand. med. *L. Sev. Petersen*.

Af obduktionsfund ved de 218 sektioner skal nævnes:

Carcinomer fandtes i 32 tilfælde fordelt som nedenstaaende tabel viser:

Tab. I.

<i>Carcinoma</i>	Under 20 aar		20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	over 70 aar	Sum
	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
ventriculi . . .				1	1		1	1	2	1		1	1	7
oesophagi . . .								1	1					1
duodeni . . .			1								*			1
pankreatis . . .												1		1
hepatis . . .									1	1				2
vesicae felleae .							1							1
coli et recti .				1				2		1				4
mammæ . . .										1				1
labii (metast. fra)											2			3
gl thyreoid . .													1	1
cutis multipl .														1
cerebri . . .						1**					1			1
vesicae . . .														1
Sum			1	2	1	1	1	3	3	2	3	1	4	20
			1	3		1	2	5	4	2	3	1	6	12
														33

Anm.: * I det som *Carc.*, *vesicae* opførte tilfælde fandtes desuden *Carcinoma* duodeni af en anden natur end svulsten i *vesicae*.
 ** Intel primært udgangspunkt prævist.

Tuberkulose. I 39 tilfælde paavistes tuberkulose som direkte eller indirekte årsagsag: i 17,9 % af samtlige obduktioner.

I lighed med, hvad der har været tilfældet i de sidste aar, har ogsaa i 1904 opmærksomheden været rettet paa paavisning af gammel — latent eller ubredet — tuberkulose ogsaa hos tilsyneladende ikke tuberkulose; men da statistikken for disse tilfælde har sin væsentligste betydning, naar de kan samles i en massesstatistik, opføres de ikke her.

Det vilde være meget vanskeligt, ja umuligt, at afgjøre med nogenlunde sikkerhed, hvor den tuberkulose proces primært har havt sit sæde i alle de omskredne tilfælde af tuberkulose, der er kommet til sektion.

I tab. II er derfor lokaliseringen opført, eftersom processen har været særlig fremtrædende eller i nogle tilfælde, hvor den paaviselig har været det udgangspunkt, hvorfra infektionen er spredt videre (f. eks.: i ét tilfælde af tuberkulose i parathyroidkirtler, der havde tomt sig i en bronchialgren, eller tuberkulose i lungen med arrosion af en pulmonalvene og miliartuberkulose.

Tab. II.

		Alder:															Sum	
		0—1	1—5	5—10	10—15	15—20	20—25	25—30	30—35	35—40	40—45	45—50	50—55	55—60	60—65	65—70		70
be	pulmonum				1	1	3	4	1	4	2	2		1				19
-	intestinorum		1			2			1				1	1				6
-	urogenitalis				1		1	1				1						4
-	genitalium femin. .						1											1
-	genus					1	1			1								3
-	coxae									1								1
-	columnæ vertebral.						1											1
-	gl. lymph. general.		1						1									2
-	— præsert.																	
	thoracis		1		1													2
		3			3	4	7	5	3	6	2	3	1	2				39

Ved denne gruppering kommer dog en del vigtige men dog mere „sekundære“ lokaliseringer ikke til sin ret, saaledes fremforalt miliartuberkulosen og en tuberkulose meningit.

I tab. III er forsøgt en sammenstilling af disse sekundære lokaliseringer i forhold til de i tab. II opførte „primære“.

Ved hver af de „primære“ findes en eller flere „sekundære“ tuberkulose processer.

Sarcom fandtes i 5 tilfælde: 1. *S. ventrikuli* hos en 37aarig kvinde. 2. *S. duræ matris* hos 48aarig mand. 3. *S. ovarii* hos 45aarig kvinde. 4. *S. nasi* hos 38aarig mand, død af meningit. 5. *Melano-sarcoma orbitæ* hos 46aarig mand.

Typhus abdominalis kom 2 gange til sektion.

Sygdomme i *lever-* og *galdeveie* fandtes 9 gange, deraf to gange af sekundær natur. Desuden er der gjentagne gange fundet calculi vesicæ felleæ, som ikke har givet anledning til andre patholog. anat. forandringer og heller ikke kan sees at have givet særlige kliniske symptomer.

Sygdomme i *centralnervesystemet* paavistes 24 gange. I et tilfælde var der cerebrosppinalmeningit med subacut forløb, i et tilfælde bulbærparalyse, 1 paralysis generalis, 1 tabes dorsalis. I 6 tilfælde var der suppurerede processer i sinus, hjernebinder eller hjerne sekundært efter otitis media eller interna.

Desuden et tilfælde af sarcoma duræ matris (opført under sarcomer).

1 tilfælde glioma hos en 47aarig mand.

Af mere eiendommelige tilfælde skal nævnes: 1. Hos en 40 aar gammel mand fandtes et aneurisma rami pancreat. venæ portæ. 2. Hos en 50 aar gl. mand fandtes et brustent aneurisma art. meseraica med stor blødning. 3. Hos en 44aarig mand, der var død af acut peritonit, fandtes denne at bero paa en perforation af rectum i dybden af fossa Douglas. Der viste sig at være en gammel ulceration, men der fandtes ved den mikroskopiske undersøgelse ingen tegn paa lues, tbc. eller svulstdannelse.

Ved obduktionen af de 67 nyfødte barn fandtes

Syphilis i 15 tilfælde.

Døden skyldtes i de øvrige tilfælde:

Besværlig fødsel hos	14
Eklampsi hos moderen	2
For tidlig fødsel	6
Misdannelse	3
Andre aarsager	23
Placenta prævia og navlesnorfremfald	4
	<hr/>
	67

16 levede ved fødselen.

45 var dødfødte.

6 var ikke levedygtige fostre.

Af dyreforsøg er udført 75, hvortil er benyttet marsvin, kaniner, mus samt en høne med kyllinger.

Af legale sektioner udførtes 18 for Kristiania by, hvortil kommer nogle for Aker.

Ved de tilsendte organer fra 55 sektioner udenfor institutet fandtes:

Anæmia perniciosæ	2
Aktinomykose	1
Aortitis luetica	1
Aneurisma aortæ	1
Apoplexia cerebri	1
Carcinom	12

Cirrhosis hepatis	1
Gummata hepatis	1
Glioma cerebri et cerebelli	3
Hydronephrosis bilateralis	1
Leukaemia	1
Meningit ved otitis media	1
Myoearditis fibrosa	1
Neplritis	7
Pneumonia erouposa	1
Sarcoma	4
Tuberculose	11
Strietura oesoplagi	1
Ulcus ventriculi	2

2 tilfælde af tuberculose forekom hos barn resp. 5 og 6 maaneder gamle.
1 tilfælde af neplrit var medfødt skrumphyre hos et 15 mdr. gl. barn.

Der er i aarets løb modtaget og undersøgt 712 „præparater“ foruden organerne fra de før nævnte 54 obduktioner udført af læger udenfor institutet.

For rigshospitalet og Kristiania fødselsstiftelse undersøgtes 337 præparater, for andre sygehuse og privatlæger 375. De fleste af disse sidste skriver sig fra læger og sygehuse i Kristiania; men der er ogsaa indsendt mange fra det øvrige land.

Naar undtages nogle faa præparater, der er fulgt med skyllevandet ved maveudskylling eller med afføringen ved bændelormkure o. lign. er samtlige vundne ved operationer.

Desuden er der udført for Rigshospitalet og privatlæger ca. 150 undersøgelser af uriner, sputa, punktionsvæsker, nyre- og galdestene. Disse undersøgelser protokolleres i almindelighed ikke.

De nedenstaaende tabeller giver en oversigt over de vigtigere pathologiske fund. Tallene gjælder antal patienter, ikke antal præparater, idet der f. ex. ved carcinoma uteri kun er regnet et tilfælde, selv om der er gjort undersøgelse af to eller flere præparater (udskrabning og den exstirperede uterus) fra samme patient.

Tab. 4 over Carcinomer	133 tilfælde
— 5 - Sarcomer	68 —
— 6 - Tuberculose	74 —

Af andre *maligne svulster* (end carcinomer og sarkomer) er undersøgt:

Glioma bulbi	1
Hypernephroma	1
Cystadenoma renum	1
Blandingssvulst fra læben	1
Endothelioma orbitae	3
— labii	1
— eutis	3
— ovariorum	1
— renis	1
Perithelioma (?) intestin.	1

Sarcoma		Alder:		0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70	Ukj. alder		$\frac{\Sigma}{1}$	Sum	
Kjøn:		M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
S.	femors			1										1						1		1	3
—	fibulae														1							1	1
—	paa benet ellers											1	1							1		1	2
—	nervi ischiadic.												1									1	1
—	pelvis, coxae & natium															1				1		1	2
—	digiti							1														1	1
—	ulnae							1															1
—	paa armen forøvrigt							1			1											3	1
—	scapulae							1														1	1
—	axillae					1																	1
—	maxillae & gingivae.			1	1			1	1			1	1					1				1	2
—	abdominis							1	1			2 ¹	1			1		1				4	5
—	orbitae																					2	4
—	colli, reg submax, reg.																					1	∞
—	parot.							1				1										2	5
—	cutis					1					1							1	1 ²			2	3
—	nasi et o. ethmoid																		1		1	1	1
—	oculi & orbitae										1											1	1
—	testis																					1	1
—	uteri											1	1			1							4
—	ovarior																					1	1
—	mammae											1										2	2
—	renis													1								1	1
—	recidiv et metastasis									1										1	1	2	2
Totalsum		1	1	2	1	1	2	3	4	1	2	1	3	2	2	1	1	3	4	4	2	26	39
Sarcoma tragi		1	3	2	2	2	7	3	1	1	5	7	4	5	3	8	2	4	8	2	67		
+ 1 kjøn ukjendt.																						1	
																							68

11 et carotides et et carotidomaxillae linum finitae et

Some tight gutters.

No title page or copyright.

(Some)

Text run into gutters

(Tables)



